

Colimil®: istruzioni per l'uso

- ◆ avvitare il tappo del flaconcino di Colimil® fino a far scendere la polverina
- ◆ agitare il flaconcino per permettere alla polvere di disperdersi nel liquido
- ◆ svitare e togliere il tappo

-alimentazione al seno:

- ◆ versare in un cucchiaino parte del contenuto e somministrare per più volte, fino ad esaurimento dell'intero contenuto

-alimentazione con latte formulato:

- ◆ versare l'intero contenuto del flaconcino nel latte e somministrare

E' preferibile iniziare il trattamento somministrando 2 flaconcini di Colimil® al dì per 5/6 giorni prima dei due ultimi pasti giornalieri (serale e notturno), per poi passare ad un solo flaconcino.

Se un solo flaconcino non fosse sufficiente o se il fenomeno si riproponesse, è possibile continuare con 2 flaconcini al dì fino alla completa scomparsa dei sintomi e ripetere poi il passaggio ad un solo flaconcino.

Si deve tener presente che la massima efficacia del trattamento sarà raggiunta solitamente **dopo il 3° giorno dalla prima somministrazione.**

AVVERTENZE IMPORTANTI:

Le polveri non vengono sottoposte ad alcun trattamento al fine di preservarne l'efficacia e l'integrità, pertanto, si possono verificare leggere agglomerazioni date dalla presenza di una umidità naturale.

Il fenomeno non pregiudica né la qualità né l'efficacia del prodotto.